

Information efter operation av tandimplantat i käken

Du har idag fått ett eller flera tandimplantat installerade i käken, eller ska få det inom en nära framtid. Nedan följer information om hur ingreppet går till, vilka risker som finns samt vilka efterbesvär som är normala under läkningsperioden.

Hur ingreppet går till:

Ett tandimplantat är en titanskruv som opereras in i käkbenet för att fungera som fäste för en framtida tandkrona, bro eller protes. Ingreppet utförs under lokalbedövning och innebär att tandköttet öppnas, implantatet placeras i käkbenet och därefter sys tandköttet ihop. På implantatet sätts en tillfällig distans eller läkningsskruv. Efter operationen behöver implantatet läka fast i benet.

Obehaget brukar vara värst den tredje dagen efter en operation. Blir det inte bättre efter det så kontakta kliniken.

Rekommenderade läkemedel:

Besvären är oftast som störst de första 2–3 dagarna och avtar successivt. Smärta kan vanligtvis lindras med receptfria smärtstillande läkemedel enligt ordination från tandläkare.

Risker och komplikationer

Vid all kirurgi finns vissa risker:

- Infektion i operationsområdet
- Fördröjd eller utebliven läkning av implantatet
- Skador på intilliggande tänder, nerver eller bihålor
- Implantatförlust, vilket innebär att implantatet inte fäster i benet

Rökning, dålig munhygien och vissa allmänsjukdomar kan öka risken för komplikationer.

Förväntade efterbesvär

Efter ingreppet är det normalt att uppleva:

- Svullnad i kind och/eller käke
- Ömhet eller smärta i operationsområdet
- Blåmärken på huden eller i munnen
- Lätt blödning första dygnet
- Svårighet att gapa helt under några dagar

Vad du bör tänka på efter ingreppet

- Undvik att röra operationsområdet med fingrar eller tunga
- Avstå från rökning och snus under läkningstiden
- Undvik hård fysisk ansträngning första dagarna
- Det går bra att borsta tänderna, men var försiktig vid sårområdet de första dagarna
- Ät mjuk kost och undvik att tugga direkt på implantatområdet
- Har du fått stygn så tas de bort vid kontrollbesöket efter 2 veckor

När ska du kontakta kliniken?

Kontakta kliniken om du upplever:

- Tilltagande smärta eller svullnad efter flera dagar
- Feber eller varbildning
- Ihållande kraftig blödning
- Domningar som inte avtar
- Att implantatet känns löst

Tveka inte att höra av dig vid frågor eller oro. Uppföljningsbesök är en viktig del av behandlingen för att säkerställa god läkning och långsiktigt resultat.

016-12 15 05
Ehnfors@ptj.se

**Akuta besvär kvällar
& helger: 1177**